



## **DK ЕКСПОЗ**

**Високий вміст олії в насінні**

Гібрид інтенсивного типу із сильною кореневою системою, інтенсивним гілкуванням та високим потенціалом продуктивності. Відносно повільні темпи весняного відновлення вегетації, з одного боку, дають змогу мінімізувати ризики ушкодження генеративних пагонів весняними заморозками, а з другого — сформувати більшу листову масу для максимальної реалізації потенціалу продуктивності. Гібрид має високу стійкість проти основних грибних хвороб та ген стійкості до ВЖМТ

### **Сортотип**

класичний

### **Група Стиглості**

середньостиглий

### **рекомендації**

✓ Рекомендовані зони вирощування: усі зони.  
✓ Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий. ✓ Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на суглинкових, глинистих ґрунтах. ✓ Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот.  
✓ Календарний строк сівби: •ранній — 5–15 серпня, •оптимальний — 15–25 серпня, •пізній — 25 серпня – 5 вересня. (можливе зміщення строків сівби в бік більш пізніх на 5–10 днів)  
✓ Рекомендована норма висіву: •ранні строки — 350–400 тис./га, •оптимальні строки — 350–450 тис./га, •пізні строки — 400–500 тис./га. ✓ Використання морфорегуляторів: •за ранніх строків сівби — 2-разове, •за оптимальних строків сівби — обов'язкове, •за пізніх строків сівби — бажане. ✓ Терміни збирання: можливе довготривале (до 15 діб) відтермінування.

### **Характеристики**

- Тип гібриду: для традиційної технології вирощування
- Група стиглості: середньопізній
- Час цвітіння: пізній
- Зимостійкість: висока
- Посухостійкість: середня
- Інтенсивність гілкування: висока
- Стійкість до фомозу: дуже висока + стійкість до вірусу жовтої мозаїки турнепсу
- Придатність до раннього висіву: допустима
- Придатність до пізнього висіву: допустима
- Висота рослин: 165–190 см