



Весна, система захисту

25 трав 2020

1. Весняна ревізія, рішення про пересівання поля.

При значному ураженні рослин морозами в зимовий період, рішення про пересів слід приймати лише тоді, коли можна достовірно визначити густоту стояння і рівномірність розміщення живих рослин на кожному конкретному полі. За потреби, можна звернутись до регіональних торгових представників ([детальна інформація про контакти тут](#)) за професійною порадою. Ранньовесняне підживлення на такому полі повинно бути проведено вчасно, навіть, якщо поле потім буде пересіяне.

2. Організація системи захисту у весняний період.

Важливим кроком для підвищення продуктивності посівів є застосування інсектицидної обробки проти стеблових прихованохоботників при середньодобовій температурі повітря в діапазоні від 4 до 8°C препаратом **Децис® 100** 0,15 л/га, який є ефективним при низьких позитивних температурах. Якщо середньодобова температура повітря наростатиме швидко, і становитиме не менше +8°C можна застосувати **Протеус®** 0,6-0,75 л/га. При сталих середньодобових температур вище як +10°C можемо застосувати препарат Коннект 0,5 л/га.

Ми підтримуємо думку про те, що основна боротьба із бур'янами повинна проводитись в осінній період. Вважаємо, що гербіциди у весняний час можуть бути застосовані лише в тому випадку, коли: прогнозовані прямі і непрямі збитки від забур'яненості можуть бути вищими ніж затрати на використання гербіцида;- можливі втрати продуктивності ріпаку від дії гербіциду будуть мінімальними.

За результатами осіннього обстеження полів нашими фахівцями, у посівах озимого ріпаку було відмічено середній рівень забур'яненості зимуючими бур'янами. В зв'язку із цим, потрібно запланувати застосування страхового гербіциду для контролю розвитку бур'янів. Рішення про застосування гербіцидів навесні повинно прийматись на полі, а внесення їх повинно бути здійснене з дотриманням рекомендацій компанії-виробника. У випадку засмічення полів злаковими бур'янами застосовуємо гербіцид **Ачіба®** 2,0-3,0 л/га до появи відкритого бутону у ріпаку діаметром більше 2 см. За висоти рослин ріпаку 15-20 см (початок росту стебла) застосовуємо фунгіциди з рід регулюючою дією **Фолікур®** 0,75-1,0 л/га та **Тілмор®** 0,8-1,0 л/га. При чому на слабких посівах без симптомів захворювання застосовуємо **Фолікур®** а за проявів захворювання або на сильно розвинутих посівах з осені, де є більші передумови розвитку хвороб – **Тілмор®**. Норму застосування цих препаратів також збільшують залежно від наявності хвороб. Максимальні норми препаратів також застосовують на слабких після перезимівлі рослинах (додаткове вкорінення) та на загущених посівах (густота вище 40 шт/м²) – профілактика вилягання.

Сподіваємося, що дані рекомендації допоможуть Вам уникнути небажаних ризиків та зберегти врожаї на рівні очікуваних показників незважаючи на стресові чинники.

